

Ficha Técnica

Lactato de Ringer



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre:	Lactato de Ringer.
Composición:	Cada mL contiene: <ul style="list-style-type: none"> • Cloruro de Sodio 6.0 mg • Cloruro de Potasio 0.30 mg • Cloruro de Calcio dihidratado 0.20 mg • 5.17 mg de lactate de sodio al 60% equivalente a 3.10 mg de lactato de sodio
Laboratorio:	Norstray Nuart.
Forma Farmacéutica:	Solución Inyectable.
Vida Útil:	24 meses siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.
Material de Envase:	Bolsa de PVC incoloro transparente, con tapón de policarbonato/silicona incolora, con sobrebolsa de PET/PPP.
Presentación Comercial:	Bolsa x 500 mL, x 1000 mL y x 3000 mL.

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

Vía de Administración:	Intravenosa / Irrigación.	Posología:	A juicio médico.
Indicaciones Terapéuticas:	<ul style="list-style-type: none"> • Reestablecimiento del fluido extracelular y balance electrolítico o reemplazo de la pérdida de fluido extracelular cuando concentraciones isotónicas de electrolíticos sean suficientes. • Reemplazo de volumen a corto plazo (solo o asociado con coloide) en caso de hipovolemia o hipotensión. • Regulación o mantenimiento del balance de acidosis metabólica y/o tratamiento de la acidosis metabólica leve a moderada (Excepto acidosis láctica). 		
Reacciones Adversas:	<p>Los efectos adversos más comúnmente descritos son la hiperhidratación (edemas) y las alteraciones electrolíticas (principalmente después de la administración de un volumen importante de solución Ringer Lactato), así como las reacciones alérgicas generalizada, exantema, eritema, prurito, tumefacción cutánea, edema periorbitario, facial o laríngeo (edema de Quincke).</p> <p>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Los efectos adversos más comúnmente descritos son la hiperhidratación (edemas) y las alteraciones electrolíticas (principalmente después de la administración de un volumen importante de solución Ringer Lactato), así como las reacciones alérgicas. Pirexia, infección en el sitio de la inyección, reacción local, dolor local (asociados a la administración intravenosa).</p> <p>Las reacciones adversas pueden estar asociadas a los medicamentos añadidos a la solución. En caso de reacciones adversas, debe interrumpirse la perfusión.</p>		
Contraindicaciones y Advertencias:	<p>Como en otras soluciones de infusión que contienen calcio, la administración concomitante de ceftriaxona y Lactato de Ringer Norstray & Nuart está contraindicada en recién nacidos (28 días de edad). Aunque se utilicen líneas de infusión separadas (riesgo de precipitación mortal de la sal de calcio con ceftriaxona en el torrente sanguíneo del recién nacido).</p> <p>Esta solución está contraindicada en pacientes que presenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hipersensibilidad conocida al lactato de sodio • Hiperhidratación extracelular o hipervolemia • Insuficiencia renal grave (con oliguria/anuria) • Fallo cardíaco no compensado • Hiperpotasemia • Hipercalcemia • Alcalosis metabólica • Cirrosis ascítica • Acidosis metabólica grave • Condiciones asociadas a un incremento de los niveles de lactato (hiperlactatemia) incluyendo la acidosis láctica • Utilización deteriorada de los lactatos como en insuficiencia hepatocelular grave o metabolismo de lactatos deteriorados • Terapia concomitante con digitalicos 		

INFORMACIÓN CORPORATIVA

CÓDIGO INTERNO	PRESENTACIONES	NO. DE REGISTRO SANITARIO INVIMA
NN4006	Lactato Ringer Hartman, Bolsa x 500 mL.	2018M-0018341
NN4007	Lactato Ringer Hartman, Bolsa x 1000 mL.	2018M-0018341
NN4008	Lactato Ringer Hartman, Bolsa x 3000 mL.	2018M-0018341

USO HOSPITALARIO-ESTÉRIL APIRÓGENA

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacénesse a temperatura inferior de 30°C en su envase y empaque original.

CONTÁCTENOS

Email
info@norstraynuart.com
Teléfono: +57 (1) 295 66 16

IMPORTADO POR

Norstray Nuart S.A.S.
Tv. 93 #51-98 Bodega 73A, Parque Empresarial Puerta Del Sol,
Bogotá, Colombia.
Zona Franca Zofia, Manzana 7, Bod. 1,
Galapa, Colombia.
www.norstraynuart.com